



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE
COORDENAÇÃO DE GOVERNANÇA CLÍNICA

Tipo do documento	Protocolo de uso	PUEPIS/SAS	Versão: 02/2020
		Pág.: 1/43	
Título do documento	Protocolo sobre uso de Equipamentos de proteção individual nas unidades de saúde de Aparecida de Goiânia e demais estabelecimento de saúde. (Atualização)	Data de emissão: 26/03/2020	
		Revisão: 09/07/2020	

1. Introdução

Em virtude da prevenção e do Controle de Infecção pelo vírus SARS-COV2, tendo como fundamento a NOTA TÉCNICA GVIMS/ GGTES/ ANVISA N°04/2020 atualizada em 08/005/2020 pela NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA N° 06/2020 e N°07/2020 orientamos as seguintes condutas:

Quanto a disseminação, sabe-se até o momento que o novo Coronavírus (SARSCoV-2) é transmitido pelo contato direto, principalmente por meio de gotículas respiratórias e pelo contato indireto por meio das mãos, objetos ou superfícies contaminadas, de forma semelhante com que outros patógenos respiratórios se espalham, desta forma a importância do uso de equipamentos de proteção individual.

2. Objetivo

Orientar a equipe multiprofissional sobre o uso dos equipamentos de proteção por área de assistência dentro da instituição de saúde.

3. Definições

O profissional deverá avaliar a exposição do risco: o risco previsto de exposição e grau de contato com sangue, fluidos corporais, gotículas respiratórias, e/ou pele exposta, com base nessa



avaliação, selecionar quais itens de EPI usar; de acordo com as áreas de atuação de cada profissional. Lista em anexo.

Desta forma, orientamos seguir as seguintes orientações de precauções durante a assistência aos pacientes suspeitos ou confirmados;

- EM TODOS os atendimentos devem ser realizadas a lavagem das mãos com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%.
- De acordo com o protocolo do MS/ ANVISA/OMS os profissionais de saúde deverão utilizar máscaras N95, FFP2, ou equivalente, somente ao realizar procedimentos geradores de aerossóis como por exemplo, intubação ou aspiração traqueal, ventilação mecânica invasiva e não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, coletas de amostras nasotraqueais, ou se o profissional for realizar procedimentos geradores de aerossóis ou estiver em área de isolamento onde esses procedimentos estão sendo realizados.
- A máscara N95/PFF2 ou equivalente com válvula expiratória não poderá ser utilizada, pois ela permite a saída do ar expirado pelo profissional que caso esteja infectado, poderá contaminar pacientes, profissionais e o ambiente.
- De acordo com ANVISA, EXCEPCIONALMENTE, em situações atuais onde há carência de insumos, possíveis riscos de desabastecimento e para atender a demanda da epidemia da COVID-19, a máscara N95 ou equivalente poderá ser reutilizada pelo mesmo profissional, desde que cumpridos passos obrigatórios para a retirada da máscara sem a contaminação do seu interior. Se a máscara estiver íntegra, limpa e seca, pode ser usada várias vezes durante o mesmo plantão pelo mesmo profissional (até 12 horas ou conforme definido pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH do serviço de saúde).
- O profissional deverá tomar as seguintes medidas de precaução antes de usar as máscaras N95 (além do prazo de validade designado pelo fabricante): ao remover a máscara, retire-a pelos elásticos, tomando bastante cuidado para não tocar na superfície interna e acondicione em um **saco ou envelope de papel** com os elásticos para fora, para facilitar a retirada da máscara. Nunca coloque a máscara já utilizada em um saco plástico, pois ela poderá ficar úmida e potencialmente contaminada.
- Os profissionais de saúde devem inspecionar visualmente a máscara N95/PFF2 ou equivalente, antes de cada uso, para avaliar se sua integridade foi comprometida. Máscaras úmidas, sujas, rasgadas, amassadas ou com vincos, devem ser imediatamente descartadas.



- A máscara cirúrgica não deve ser sobreposta à máscara N95 ou equivalente, pois além de não garantir proteção de filtração ou de contaminação, também pode levar ao desperdício de mais um EPI, o que pode ser muito prejudicial em um cenário de escassez.
- Frisamos que a substituição das mascarás cirúrgicas se dará nos casos de sujidade e umidade de acordo com protocolos vigentes para COVID-19 ou a cada p3 horas.
- O gorro está indicado para a proteção dos cabelos e cabeça dos profissionais em procedimentos que podem gerar aerossóis, porém a Secretaria Municipal de Saúde orienta o uso do mesmo para todos os profissionais que atuam diretamente na assistência. Nos procedimentos que geram aerossóis devem ser substituídos a cada atendimento.
- Os óculos de proteção ou protetores faciais devem ser utilizados quando houver risco de exposição do profissional a respingos de sangue, secreções corporais, excreções, etc. Os óculos de proteção ou protetores faciais devem ser exclusivos de cada profissional responsável pela assistência, devendo, imediatamente após o uso realizar a limpeza com água e sabão e posterior desinfecção com álcool líquido a 70% (quando o material for compatível), hipoclorito de sódio ou outro desinfetante como o quaternário de amônio, na concentração recomendada pelo fabricante
- As luvas de procedimentos não cirúrgicos devem ser utilizadas, no contexto da epidemia da COVID-19 (casos suspeitos ou confirmados), em qualquer contato com o paciente ou seu entorno (precaução de contato). O uso de luvas não substitui a higiene das mãos.
- Orientamos aos profissionais que realizam turno de trabalhos em estabelecimentos de saúde diferentes, sobre o manejo e cuidado com as vestimentas, ou seja, a substituição de roupas e sapatos em locais diferentes, bem como atenção a lavagem de roupa em domicílio.
- Sobre as botas de PVC usadas pelos profissionais da higienização e limpeza: cabe aos profissionais zelar pela conservação do equipamento. As botas de PVC podem ser lavadas. Recomendamos a limpeza com hipoclorito de sódio que deverá ser usado para fazer a desinfecção do solado e das superfícies externas da bota.



Confira a lista de EPIs recomendadas para os profissionais de acordo com suas respectivas áreas de atuação;

UNIDADE	SERVIÇO
	ATENDIMENTO
RECEPÇÃO/CHEQUINHO/AIH/CONTE COMIGO/TRIAGEM ADMINISTRATIVA/PORTEIRO/GUARDA MUNICIPAL/VIGILANTE/POSTO DE MEDICAÇÃO/FARMÁCIA (assistência indireta)	EPI: 1. Máscara cirúrgica ORIENTAÇÃO: 1. Higiene das mãos frequente com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%.
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	EPI: 1. Máscara cirúrgica; 2. Óculos de proteção ou protetor facial; 3. Capote sobreposto a vestimenta padrão 4. Luvas de procedimento; 5. Gorro ORIENTAÇÃO: 1. Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%; 2. Os profissionais de saúde deverão utilizar máscaras N95, FFP2, ou equivalente, óculos, avental, luva e gorro ao realizar procedimentos geradores de aerossóis como por exemplo, intubação ou aspiração traqueal, ventilação mecânica invasiva e não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, coletas de amostras nasotraqueais; ou quando estiver no mesmo ambiente;
DURANTE A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	
CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS	
PACIENTE	EPI: 1. Máscara cirúrgica para sintomático; máscara de tecido para assintomático; ORIENTAÇÃO: 1. Usar lenços de papel (tosse; espirro; secreção nasal); 2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%.



<p>ACOMPANHANTE</p>	<p>EPI: 1. Máscara de tecido; ORIENTAÇÃO: 1. Usar lenços de papel (tosse; espirro; secreção nasal); 2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%.</p>
----------------------------	---



PROFISSIONAIS DE SAÚDE	<p>EPI:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Máscara cirúrgica;2. Óculos de proteção ou protetor facial;3. Capote sobreposto a vestimenta padrão4. Luvas de procedimento;5. Gorro <p>ORIENTAÇÃO:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%;2. Os profissionais de saúde deverão utilizar máscaras N95, FFP2, ou equivalente, ao realizar procedimentos geradores de aerossóis como por exemplo, intubação ou aspiração traqueal, ventilação mecânica invasiva e não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, coletas de amostras nasotraqueais;3. Atender em salas arejadas com janela aberta e porta fechada e com ar-condicionado ou ventilador desligado.
PROFISSIONAIS DE APOIO (profissionais da higiene e limpeza, nutrição e manutenção etc)	<p>EPI:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Máscara cirúrgica;2. Óculos;3. Capote sobreposto a vestimenta padrão4. Luvas de procedimento;5. Gorro <p>ORIENTAÇÃO:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%;2. Profissionais da higiene e limpeza, acrescentar luvas de borracha com cano longo e botas impermeáveis de cano longo.
DEMAIS CASOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS CRITÉRIOS ACIMA COVID-19	
PACIENTE	<p>ORIENTAÇÃO:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Máscara de tecido e etiqueta respiratória;2. Higienizar as mãos frequente com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%.
ACOMPANHANTE	<p>ORIENTAÇÃO:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Máscara de tecido e etiqueta respiratória;2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%.



<p>PROFISSIONAIS DE SAÚDE</p>	<p>EPI:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Máscara cirúrgica;2. Luvas de procedimento (se necessário);3. Gorro, Óculos de proteção ou protetor facial e avental (para procedimentos que geram aerossóis);4. Vestimenta padrão. <p>ORIENTAÇÃO:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%;2. Os profissionais de saúde deverão utilizar máscaras N95, FFP2, ou equivalente, ao realizar procedimentos geradores de aerossóis como por exemplo, intubação ou aspiração traqueal, ventilação mecânica invasiva e não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, coletas de amostras nasotraqueais.
<p>PROFISSIONAIS DE APOIO (profissionais da higiene e limpeza, nutrição e manutenção etc)</p>	<p>EPI:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Máscara cirúrgica;2. Luvas de procedimento (se necessário);3. Gorro, óculos de proteção ou protetor facial de proteção ou protetor facial e avental (para procedimentos que geram aerossóis);4. Vestimenta padrão. <p>ORIENTAÇÃO:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%;2. Os profissionais de saúde deverão utilizar máscaras N95, FFP2, ou equivalente, ao realizar procedimentos geradores de aerossóis como por exemplo, intubação ou aspiração traqueal, ventilação mecânica invasiva e não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, coletas de amostras nasotraqueais;

UNIDADE	SERVIÇO
	CME
ÁREA SUJA	



<p>TODOS OS PROFISSIONAIS</p>	<p>EPI:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Máscara N95, FFP2, ou equivalente;2. Óculos de proteção ou protetor facial;3. Luvas (para limpeza e desinfecção, utilizar luva de borracha cano longo);4. Avental impermeável manga longa sobre capote de manga longa;5. Bota de borracha;6. Gorro;7. Demais recomendados pela RDC 15/2012. <p>ORIENTAÇÃO:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Higienizar as mãos frequente com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%.
ÁREA LIMPA	
<p>TODOS OS PROFISSIONAIS</p>	<p>EPI:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Máscara cirúrgica;2. Luvas procedimento;4. Gorro;5. Demais recomendados pela RDC 15/2012. <p>ORIENTAÇÃO:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Higienizar as mãos frequente com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%.



UNIDADE	SERVIÇO
	CONSULTÓRIO (MÉDICO/ENFERMAGEM)
DURANTE A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	
CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS	
PACIENTE	EPI: 1. Máscara cirúrgica para sintomático; máscara de tecido PARA assintomático; ORIENTAÇÃO: 1. Usar lenços de papel (tosse; espirro; secreção nasal); 2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%.
ACOMPANHANTE	EPI: 1. Máscara de tecido; ORIENTAÇÃO: 1. Usar lenços de papel (tosse; espirro; secreção nasal); 2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%.
PROFISSIONAIS DE SAÚDE	EPI: 1. Máscara cirúrgica; 2. Óculos; 3. Capote sobreposto a vestimenta padrão 4. Luvas de procedimento; 5. Gorro ORIENTAÇÃO: 1. Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%; 2. Os profissionais de saúde deverão utilizar máscaras N95, FFP2, ou equivalente, ao realizar procedimentos geradores de aerossóis como por exemplo, intubação ou aspiração traqueal, ventilação mecânica invasiva e não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação,coletas de amostras nasotraqueais;



PROFISSIONAIS DE APOIO (profissionais da higiene e limpeza, nutrição e manutenção etc.)	EPI: 1. Máscara cirúrgica; 2. Protetor facial ou óculos de proteção; 3. Capote sobreposto a vestimenta padrão 4. Luvas de procedimento; 5. Gorro ORIENTAÇÃO: 1. Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%; 2. Profissionais da higiene e limpeza, acrescentar luvas de borracha com cano longo e botas impermeáveis de cano longo.
DEMAIS CASOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS CRITÉRIOS ACIMA COVID-19	
PACIENTE	ORIENTAÇÃO: 1. Etiqueta respiratória; 2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%.
ACOMPANHANTE	ORIENTAÇÃO: 1. Etiqueta respiratória; 2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%.
PROFISSIONAIS DE SAÚDE	EPI: 1. Máscara cirúrgica; 2. Luvas de procedimento (se necessário); 3. Gorro, óculos de proteção ou protetor facial de proteção ou protetor facial e avental (para procedimentos que geram aerossóis); 4. Vestimenta padrão. ORIENTAÇÃO: 1. Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%; 2. Os profissionais de saúde deverão utilizar máscaras N95, FFP2, ou equivalente, ao realizar procedimentos geradores de aerossóis como por exemplo, intubação ou aspiração traqueal, ventilação mecânica invasiva e não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, coletas de amostras nasotraqueais.



**PROFISSIONAIS DE APOIO
(profissionais da higiene e
limpeza, nutrição,
manutenção, etc)**

EPI:

1. Máscara cirúrgica;
2. Luvas de procedimento (se necessário);
3. Gorro, óculos de proteção ou protetor facial de proteção ou protetor facial e avental (para procedimentos que geram aerossóis);
4. Vestimenta padrão.

ORIENTAÇÃO:

1. Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%;
2. Os profissionais de saúde deverão utilizar máscaras N95, FFP2, ou equivalente, ao realizar procedimentos geradores de aerossóis como por exemplo, intubação ou aspiração traqueal, ventilação mecânica invasiva e não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, coletas de amostras nasotraqueais.
3. Profissionais da higiene e limpeza, acrescentar luvas de borracha com cano longo e botas impermeáveis de cano longo.



UNIDADE	SERVIÇO
	COZINHA
MANIPULADORES DE ALIMENTOS	EPI: 1. Máscara cirúrgica; 2. Gorro 3. Demais recomendados pela RDC 216/2004. ORIENTAÇÃO: 1. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%.



UNIDADE	SERVIÇO
	ECG
DURANTE A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	
CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS	
PACIENTE	EPI: 1. Máscara cirúrgica para sintomático; assintomático máscara de tecido; ORIENTAÇÃO: 1. Usar lenços de papel (tosse; espirro; secreção nasal); 2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%.
ACOMPANHANTE	EPI: 1. Máscara de tecido; ORIENTAÇÃO: 1. Usar lenços de papel (tosse; espirro; secreção nasal); 2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%.
PROFISSIONAIS DE SAÚDE	EPI: 1. Máscara cirúrgica; 2. Óculos ou protetor facial 3. Capote sobreposto a vestimenta padrão 4. Luvas de procedimento; 5. Gorro ORIENTAÇÃO: 1. Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%.
PROFISSIONAIS DE APOIO (profissionais da higiene e limpeza, nutrição, manutenção, etc)	EPI: 1. Máscara cirúrgica; 2. Óculos; 3. Capote sobreposto a vestimenta padrão 4. Luvas de procedimento; 5. Gorro ORIENTAÇÃO: 1. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%; 2. Profissionais da higiene e limpeza, acrescentar luvas de borracha com cano longo e botas impermeáveis de cano longo.
DEMAIS CASOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS CRITÉRIOS ACIMA COVID-19	



PACIENTE	ORIENTAÇÃO: 1. Etiqueta respiratória; 2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%.
ACOMPANHANTE	ORIENTAÇÃO: 1. Etiqueta respiratória; 2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%.
PROFISSIONAIS DE SAÚDE	EPI: 1. Máscara cirúrgica; 2. Luvas de procedimento; 4. Vestimenta padrão. ORIENTAÇÃO: 1. Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%.
PROFISSIONAIS DE APOIO (profissionais da higiene e limpeza, nutrição, manutenção, etc)	EPI: 1. Máscara cirúrgica; 2. Luvas de procedimento; 4. Vestimenta padrão. ORIENTAÇÃO: 1. Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%;



UNIDADE	SERVIÇO
	ENFERMARIA
DURANTE A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	
CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS	
PACIENTE	EPI: 1. Máscara cirúrgica para sintomáticos; máscara de tecido para assintomáticos; ORIENTAÇÃO: 1. Usar lenços de papel (tosse; espirro; secreção nasal); 2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%.
ACOMPANHANTE	EPI: 1. Máscara tecido; ORIENTAÇÃO: 1. Usar lenços de papel (tosse; espirro; secreção nasal); 2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%.
PROFISSIONAIS DE SAÚDE	EPI: 1. Máscara cirúrgica; 2. Óculos de proteção ou protetor facial; 3. Capote sobreposto a vestimenta padrão 4. Luvas de procedimento; 5. Gorro ORIENTAÇÃO: 1. Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%; 2. Os profissionais de saúde deverão utilizar máscaras N95, FFP2, ou equivalente, ao realizar procedimentos geradores de aerossóis como por exemplo, intubação ou aspiração traqueal, ventilação mecânica invasiva e não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, coletas de amostras nasotraqueais; ou se estiverem no ambiente que estiver sendo gerado aerossóis.



PROFISSIONAIS DE APOIO (profissionais da higiene e limpeza, nutrição, manutenção, etc)	<p>EPI:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Máscara cirúrgica;2. Óculos;3. Capote sobreposto a vestimenta padrão4. Luvas de procedimento;5. Gorro <p>ORIENTAÇÃO:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%;2. Profissionais da higiene e limpeza, acrescentar luvas de borracha com cano longo e botas impermeáveis de cano longo.3- Os profissionais de saúde deverão utilizar máscaras N95, FFP2, ou equivalente, ao realizar procedimentos geradores de aerossóis como por exemplo, intubação ou aspiração traqueal, ventilação mecânica invasiva e não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, coletas de amostras nasotraqueais; ou se estiverem no ambiente que estiver sendo gerado aerossóis
DEMAIS CASOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS CRITÉRIOS ACIMA COVID-19	
PACIENTE	<p>ORIENTAÇÃO:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Etiqueta respiratória;2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%.
ACOMPANHANTE	<p>ORIENTAÇÃO:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Etiqueta respiratória;2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%.
PROFISSIONAIS DE SAÚDE	<p>EPI:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Máscara cirúrgica;2. Luvas de procedimento (se necessário);3. Gorro, Óculos de proteção ou protetor facial de proteção ou protetor facial e avental (para procedimentos que geram aerossóis);4. Vestimenta padrão. <p>ORIENTAÇÃO:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%;2. Os profissionais de saúde deverão utilizar máscaras N95, FFP2, ou equivalente, ao realizar procedimentos geradores de aerossóis como por exemplo, intubação ou aspiração traqueal, ventilação mecânica invasiva e não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, coletas de amostras nasotraqueais.



<p>PROFISSIONAIS DE APOIO</p>	<p>EPI:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Máscara cirúrgica;2. Luvas de procedimento (se necessário);3. Gorro, Óculos de proteção ou protetor facial de proteção ou protetor facial e avental (para procedimentos que geram aerossóis);4. Vestimenta padrão. <p>ORIENTAÇÃO:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%;2. Os profissionais de saúde deverão utilizar máscaras N95, FFP2, ou equivalente, ao realizar procedimentos geradores de aerossóis como por exemplo, intubação ou aspiração traqueal, ventilação mecânica invasiva e não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação,coletas de amostras nasotraqueais.
--------------------------------------	--



UNIDADE	SERVIÇO
	ESTABILIZAÇÃO
DURANTE A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	
CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS	
PACIENTE	EPI: 1. Máscara cirúrgica; ORIENTAÇÃO: 1. Usar lenços de papel (tosse; espirro; secreção nasal); 2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%.
ACOMPANHANTE	EPI: 1. Máscara cirúrgica; ORIENTAÇÃO: 1. Usar lenços de papel (tosse; espirro; secreção nasal); 2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%.
PROFISSIONAIS DE SAÚDE	EPI: 1. Mascara N95, PFF2 ou equivalente; 2. Protetor facial; ou óculos de proteção; 3. Capote sobreposto a vestimenta padrão 4. Luvas de procedimento; 5. Gorro ORIENTAÇÃO: 1. Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%; 2. Os profissionais de saúde deverão utilizar máscaras N95, PFF2, ou equivalente, ao realizar procedimentos geradores de aerossóis como por exemplo, intubação ou aspiração traqueal, ventilação mecânica invasiva e não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, coletas de amostras nasotraqueais;



PROFISSIONAIS DE APOIO (profissionais da higiene e limpeza, nutrição, manutenção, etc)	EPI: <ol style="list-style-type: none">1. Máscara N95/PFF2 ou equivalente;2. Óculos de proteção ou protetor facial;3. Capote sobreposto a vestimenta padrão4. Luvas de procedimento;5. Gorro ORIENTAÇÃO: <ol style="list-style-type: none">1. Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%;2. Profissionais da higiene e limpeza, acrescentar luvas de borracha com cano longo e botas impermeáveis de cano longo.
DEMAIS CASOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS CRITÉRIOS ACIMA COVID-19	
PACIENTE	ORIENTAÇÃO: <ol style="list-style-type: none">1. Máscara cirúrgica e Etiqueta respiratória;2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%.
ACOMPANHANTE	ORIENTAÇÃO: <ol style="list-style-type: none">1. Máscara cirúrgica e Etiqueta respiratória;2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%.
PROFISSIONAIS DE SAÚDE	EPI: <ol style="list-style-type: none">1. Máscara N95/PFF2 ou equivalente;2. Protetor facial ou óculos de proteção;3. Capote sobreposto a vestimenta padrão4. Luvas de procedimento;5. Gorro ORIENTAÇÃO: <ol style="list-style-type: none">1. Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%;2. Os profissionais de saúde deverão utilizar máscaras N95, FFP2, ou equivalente, ao realizar procedimentos geradores de aerossóis como por exemplo, intubação ou aspiração traqueal, ventilação mecânica invasiva e não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, coletas de amostras nasotraqueais;



PROFISSIONAIS DE APOIO
(profissionais da higiene e
limpeza, nutrição,
manutenção, etc)

EPI:

1. Máscara N95/PPF2;
2. Capote sobreposto a vestimenta padrão
4. Luvas de procedimento;
5. Gorro

ORIENTAÇÃO:

1. Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%;
2. Profissionais da higiene e limpeza, acrescentar luvas de borracha com cano longo e botas impermeáveis de cano longo.



UNIDADE	SERVIÇO
	INALAÇÃO
DURANTE A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	
CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS	
PACIENTE	EPI: 1. Máscara cirúrgica; ORIENTAÇÃO: 1. Usar lenços de papel (tosse; espirro; secreção nasal); 2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%.
ACOMPANHANTE	EPI: 1. Máscara cirúrgica; ORIENTAÇÃO: 1. Usar lenços de papel (tosse; espirro; secreção nasal); 2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%.
PROFISSIONAIS DE SAÚDE	EPI: 1. Máscara N95/PPF2 ou equivalente; 2. Óculos de proteção ou protetor facial 3. Capote sobreposto a vestimenta padrão 4. Luvas de procedimento; 5. Gorro ORIENTAÇÃO: 1. Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%; 2. Os profissionais de saúde deverão utilizar máscaras N95, FFP2, ou equivalente, ao realizar procedimentos geradores de aerossóis como por exemplo, intubação ou aspiração traqueal, ventilação mecânica invasiva e não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, coletas de amostras nasotraqueais;



PROFISSIONAIS DE APOIO (profissionais da higiene e limpeza, nutrição, manutenção, etc)	<p>EPI:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Máscara N95/PFF2;2. Óculos;3. Capote sobreposto a vestimenta padrão4. Luvas de procedimento;5. Gorro <p>ORIENTAÇÃO:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%;;2. Profissionais da higiene e limpeza, acrescentar luvas de borracha com cano longo e botas impermeáveis de cano longo.
DEMAIS CASOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS CRITÉRIOS ACIMA COVID-19	
PACIENTE	<p>ORIENTAÇÃO:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Etiqueta respiratória;2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%.
ACOMPANHANTE	<p>ORIENTAÇÃO:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Etiqueta respiratória;2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%.
PROFISSIONAIS DE SAÚDE	<p>EPI:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Máscara N95/PFF2;2. Luvas de procedimento;3. Gorro, óculos de proteção ou protetor facial e avental (para procedimentos que geram aerossóis);4. Vestimenta padrão. <p>ORIENTAÇÃO:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%;2. Os profissionais de saúde deverão utilizar máscaras N95, FFP2, ou equivalente, ao realizar procedimentos geradores de aerossóis como por exemplo, intubação ou aspiração traqueal, ventilação mecânica invasiva e não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, coletas de amostras nasotraqueais ou no mesmo ambiente onde está sendo gerado aerossóis.



<p>PROFISSIONAIS DE APOIO (profissionais da higiene e limpeza, nutrição, manutenção, etc)</p>	<p>EPI:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Máscara cirúrgica;2. Luvas de procedimento;3. Gorro, óculos de proteção ou protetor facial e avental (para procedimentos que geram aerossóis);4. Vestimenta padrão. <p>ORIENTAÇÃO:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%;2. Os profissionais de saúde deverão utilizar máscaras N95, FFP2, ou equivalente, ao realizar procedimentos geradores de aerossóis como por exemplo, intubação ou aspiração traqueal, ventilação mecânica invasiva e não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, coletas de amostras nasotraqueais.
---	--



UNIDADE	SERVIÇO
	ISOLAMENTO
PACIENTE	<p>EPI: 1. Máscara cirúrgica;</p> <p>ORIENTAÇÃO: 1. Usar lenços de papel (tosse; espirro; secreção nasal); 2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%.</p>
PROFISSIONAIS DE SAÚDE	<p>EPI: 1. Máscara N95/PPF2; 2. Protetor facial, ou óculos de proteção 3. Capote sobreposto a vestimenta padrão 4. Luvas de procedimento; 5. Gorro</p> <p>ORIENTAÇÃO: 1. Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%; 2. Os profissionais de saúde deverão utilizar máscaras N95, FFP2, ou equivalente, ao realizar procedimentos geradores de aerossóis como por exemplo, intubação ou aspiração traqueal, ventilação mecânica invasiva e não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, coletas de amostras nasotraqueais;</p>
PROFISSIONAIS DE APOIO (profissionais da higiene e limpeza, nutrição, manutenção, etc)	<p>EPI: 1. Máscara cirúrgica; 2. Óculos; 3. Capote sobreposto a vestimenta padrão 4. Luvas de procedimento; 5. Gorro</p> <p>ORIENTAÇÃO: 1. Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%; 2. Profissionais da higiene e limpeza, acrescentar luvas de borracha com cano longo e botas impermeáveis de cano longo. O uso de N95/PPF2 deve ser considerado em ambiente geradores de aerossóis.</p>



UNIDADE	SERVIÇO
	LABORATÓRIO
DURANTE A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	
CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS	
PACIENTE	EPI: 1. Máscara cirúrgica para sintomático; máscara de tecido para assintomático; ORIENTAÇÃO: 1. Usar lenços de papel (tosse; espirro; secreção nasal); 2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%.
ACOMPANHANTE	EPI: 1. Máscara de tecido; ORIENTAÇÃO: 1. Usar lenços de papel (tosse; espirro; secreção nasal); 2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%.
PROFISSIONAIS DE SAÚDE	EPI: 1. Máscara cirúrgica; 2. Protetor facial ou óculos de proteção; 3. Capote sobreposto a vestimenta padrão 4. Luvas de procedimento; 5. Gorro ORIENTAÇÃO: 1. Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%; 2. Os profissionais de saúde deverão utilizar máscaras N95, FFP2, ou equivalente, ao realizar procedimentos geradores de aerossóis como por exemplo, intubação ou aspiração traqueal, ventilação mecânica invasiva e não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, coletas de amostras nasotraqueais.



PROFISSIONAIS DE APOIO (profissionais da higiene e limpeza, nutrição, manutenção, etc)	<p>EPI:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Máscara cirúrgica;2. Óculos;3. Capote sobreposto a vestimenta padrão4. Luvas de procedimento;5. Gorro <p>ORIENTAÇÃO:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%;2. Profissionais da higiene e limpeza, acrescentar luvas de borracha com cano longo e botas impermeáveis de cano longo.
DEMAIS CASOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS CRITÉRIOS ACIMA COVID-19	
PACIENTE	<p>ORIENTAÇÃO:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Etiqueta respiratória;2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%.
ACOMPANHANTE	<p>ORIENTAÇÃO:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Etiqueta respiratória;2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%.
PROFISSIONAIS DE SAÚDE	<p>EPI:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Máscara cirúrgica;2. Luvas de procedimento;3. Gorro, óculos de proteção ou protetor facial; avental (para procedimentos que geram aerossóis);4. Vestimenta padrão. <p>ORIENTAÇÃO:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%;2. Os profissionais de saúde deverão utilizar máscaras N95, FFP2, ou equivalente, ao realizar procedimentos geradores de aerossóis como por exemplo, intubação ou aspiração traqueal, ventilação mecânica invasiva e não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, coletas de amostras nasotraqueais.



<p>PROFISSIONAIS DE APOIO (profissionais da higiene e limpeza, nutrição, manutenção, etc)</p>	<p>EPI:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Máscara cirúrgica;2. Luvas de procedimento;3. Gorro, óculos de proteção ou protetor facial e avental (para procedimentos que geram aerossóis);4. Vestimenta padrão. <p>ORIENTAÇÃO:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%;2. Os profissionais de saúde deverão utilizar máscaras N95, FFP2, ou equivalente, ao realizar procedimentos geradores de aerossóis como por exemplo, intubação ou aspiração traqueal, ventilação mecânica invasiva e não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação,coletas de amostras nasotraqueais.
---	---



UNIDADE	SERVIÇO
	LAVANDEIRA
ÁREA SUJA	
TODOS OS PROFISSIONAIS	<p>EPI:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Máscara N95, FFP2, ou equivalente;2. Óculos de proteção ou protetor facial;3. Luvas (para limpeza e desinfecção, utilizar luva de borracha cano longo);4. Avental impermeável manga longa sobre capote de manga longa;5. Bota de borracha de cano longo;6. Gorro;7. Demais recomendados pela RDC 06/2012. <p>ORIENTAÇÃO:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Higienizar as mãos frequente com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%.
ÁREA LIMPA	
TODOS OS PROFISSIONAIS	<p>EPI:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Máscara cirúrgica;2. Luvas procedimento;4. Gorro;5. Avental impermeável;6. Demais recomendados pela RDC 06/2012. <p>ORIENTAÇÃO:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%.



UNIDADE	SERVIÇO
	CUIDADOS PÓS-ÓBITO
CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS	
PROFISSIONAIS DE SAÚDE	<p>EPI:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Máscara N95, FFP2, ou equivalente (para procedimentos que geram aerossóis - ex.: extubação);2. Óculos de proteção ou protetor facial;3. Avental impermeável;4. Luva de procedimento;5. Gorro;6. Máscara cirúrgica;7. Propé. <p>ORIENTAÇÃO:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Higienizar as mãos com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70% após remover o EPI;3. Desinfetar e tapar os orifícios de drenagem de feridas e punção de cateter com cobertura impermeável;4. Limpar as secreções nos orifícios orais e nasais com compressas;5. Tapar/bloquear orifícios naturais do cadáver (oral, nasal, retal) para evitar extravasamento de fluidos corporais;6. Preferencialmente colocar o corpo em dupla embalagem impermeável e desinfetar a superfície externa do saco (pode-se utilizar álcool a 70^o, solução clorada [0.5% a 1%], ou outro saneante desinfetante regularizado junto a Anvisa);7. Identificar o saco externo de transporte com a informação relativa a risco biológico; no contexto da COVID-19: agente biológico classe de risco 3.



<p>PROFISSIONAIS DE APOIO</p>	<p>EPI:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Máscara N95, FFP2, ou equivalente (para procedimentos que geram aerossóis - ex.: extubação);2. Óculos;3. Avental impermeável;4. Luvas de procedimento;5. Gorro;6. Máscara cirúrgica;7. Capote sobreposto a vestimenta padrão. <p>ORIENTAÇÃO:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Higienizar as mãos com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70% após remover o EPI;3. Desinfetar e tapar os orifícios de drenagem de feridas e punção de cateter com cobertura impermeável;4. Limpar as secreções nos orifícios orais e nasais com compressas;5. Tapar/bloquear orifícios naturais do cadáver (oral, nasal, retal) para evitar extravasamento de fluidos corporais;6. Preferencialmente colocar o corpo em dupla embalagem impermeável e desinfetar a superfície externa do saco (pode-se utilizar álcool a 70º, solução clorada [0.5% a 1%], ou outro saneante desinfetante regularizado junto a Anvisa);7. Identificar o saco externo de transporte com a informação relativa a risco biológico; no contexto da COVID-19: agente biológico classe de risco 3.
--	--



UNIDADE	SERVIÇO
	ODONTOLOGIA
PROFISSIONAIS DE SAÚDE	<p>EPI:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Máscara N95/PFFP2;2. Protetor Facial;3. Avental impermeável;4. Luvas de procedimento;5. Gorro. <p>ORIENTAÇÃO:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Higienizar as mãos frequente com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%;3. Realizar sucção constante da saliva;4. Atender em salas arejadas com janela aberta e porta fechada e com ar-condicionado ou ventilador desligado;5. Evitar radiografias intraorais;6. Utilizar enxaguatório bucal antimicrobiano pré-operatório;7. Em casos em que o isolamento com dique de borracha não for possível, são recomendados dispositivos manuais, como as curetas periodontais para remoção de cáries e raspagem periodontal, a fim de minimizar ao máximo a geração de aerossol.
PROFISSIONAIS DE APOIO (ASB)	<p>EPI:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Máscara N95, FFP2;2. Protetor facial;3. Avental impermeável;4. Luvas de procedimento;5. Gorro. <p>ORIENTAÇÃO:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Higienizar as mãos frequente com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%;3. Realizar sucção constante da saliva;4. Atender em salas arejadas com janela aberta e porta fechada e com ar-condicionado ou ventilador desligado;5. Evitar radiografias intraorais;6. Utilizar enxaguatório bucal antimicrobiano pré-operatório;7. Em casos em que o isolamento com dique de borracha não for possível, são recomendados dispositivos manuais, como as curetas periodontais para remoção de cáries e raspagem periodontal, a fim de minimizar ao máximo a geração de aerossol.



UNIDADE	SERVIÇO
	POSTO DE INJEÇÃO/OBSERVAÇÃO
DURANTE A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	
CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS	
PACIENTE	EPI: 1. Máscara cirúrgica para sintomático; máscara de tecido para assintomático; ORIENTAÇÃO: 1. Usar lenços de papel (tosse; espirro; secreção nasal); 2. Higienizar as mãos frequente com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%.
ACOMPANHANTE	EPI: 1. Máscara de tecido; ORIENTAÇÃO: 1. Usar lenços de papel (tosse; espirro; secreção nasal); 2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%.
PROFISSIONAIS DE SAÚDE	EPI: 1. Máscara cirúrgica; 2. Óculos; 3. Capote sobreposto a vestimenta padrão 4. Luvas de procedimento; 5. Gorro ORIENTAÇÃO: 1. Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%; 2. Os profissionais de saúde deverão utilizar máscaras N95, FFP2, ou equivalente, ao realizar procedimentos geradores de aerossóis como por exemplo, intubação ou aspiração traqueal, ventilação mecânica invasiva e não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, coletas de amostras nasotraqueais;



PROFISSIONAIS DE APOIO (profissionais da higiene e limpeza, nutrição, manutenção, etc)	<p>EPI:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Máscara cirúrgica;2. Óculos;3. Capote sobreposto a vestimenta padrão4. Luvas de procedimento;5. Gorro <p>ORIENTAÇÃO:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%;2. Profissionais da higiene e limpeza, acrescentar luvas de borracha com cano longo e botas impermeáveis de cano longo.
DEMAIS CASOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS CRITÉRIOS ACIMA COVID-19	
PACIENTE	<p>ORIENTAÇÃO:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Etiqueta respiratória;2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%.
ACOMPANHANTE	<p>ORIENTAÇÃO:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Etiqueta respiratória;2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%.
PROFISSIONAIS DE SAÚDE	<p>EPI:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Máscara cirúrgica;2. Luvas de procedimento;3. Gorro, Óculos de proteção ou protetor facial de proteção ou protetor facial e avental (para procedimentos que geram aerossóis);4. Vestimenta padrão. <p>ORIENTAÇÃO:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%;2. Os profissionais de saúde deverão utilizar máscaras N95, FFP2, ou equivalente, ao realizar procedimentos geradores de aerossóis como por exemplo, intubação ou aspiração traqueal, ventilação mecânica invasiva e não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, coletas de amostras nasotraqueais.



**PROFISSIONAIS DE APOIO
(profissionais da higiene
e limpeza, nutrição,
manutenção, etc)**

EPI:

1. Máscara cirúrgica;
2. Luvas de procedimento;
3. Gorro, óculos de proteção ou protetor facial e avental (para procedimentos que geram aerossóis);
4. Vestimenta padrão.

ORIENTAÇÃO:

1. Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%;
2. Os profissionais de saúde deverão utilizar máscaras N95, FFP2, ou equivalente, ao realizar procedimentos geradores de aerossóis como por exemplo, intubação ou aspiração traqueal, ventilação mecânica invasiva e não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, coletas de amostras nasotraqueais.



UNIDADE	SERVIÇO
	RAIO X
DURANTE A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	
CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS	
PACIENTE	EPI: 1. Máscara cirúrgica sintomático; máscara de tecido assintomático; ORIENTAÇÃO: 1. Usar lenços de papel (tosse; espirro; secreção nasal); 2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%.
ACOMPANHANTE	EPI: 1. Máscara de tecido; ORIENTAÇÃO: 1. Usar lenços de papel (tosse; espirro; secreção nasal); 2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%.
PROFISSIONAIS DE SAÚDE	EPI: 1. Máscara cirúrgica; 2. Óculos; 3. Capote sobreposto a vestimenta padrão 4. Luvas de procedimento; 5. Gorro ORIENTAÇÃO: 1. Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%.
PROFISSIONAIS DE APOIO (profissionais da higiene e limpeza, nutrição, manutenção, etc)	EPI: 1. Máscara cirúrgica; 2. Óculos; 3. Capote sobreposto a vestimenta padrão 4. Luvas de procedimento; 5. Gorro ORIENTAÇÃO: 1. Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%; 2. Profissionais da higiene e limpeza, acrescentar luvas de borracha com cano longo e botas impermeáveis de cano longo.
DEMAIS CASOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS CRITÉRIOS ACIMA COVID-19	



PACIENTE	ORIENTAÇÃO: 1. Etiqueta respiratória; 2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%.
ACOMPANHANTE	ORIENTAÇÃO: 1. Etiqueta respiratória; 2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%.
PROFISSIONAIS DE SAÚDE	EPI: 1. Máscara cirúrgica; 2. Luvas de procedimento; 4. Vestimenta padrão. ORIENTAÇÃO: 1. Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%.
PROFISSIONAIS DE APOIO (profissionais da higiene e limpeza, nutrição, manutenção, etc)	EPI: 1. Máscara cirúrgica; 2. Luvas de procedimento; 4. Vestimenta padrão. ORIENTAÇÃO: 1. Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%.



UNIDADE	SERVIÇO
	SUTURA
DURANTE A ASSISTÊNCIA À SAÚDE	
CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS	
PACIENTE	EPI: 1. Máscara cirúrgica para sintomático e máscara de tecido para assintomático; ORIENTAÇÃO: 1. Usar lenços de papel (tosse; espirro; secreção nasal); 2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%.
ACOMPANHANTE	EPI: 1. Máscara de tecido; ORIENTAÇÃO: 1. Usar lenços de papel (tosse; espirro; secreção nasal); 2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%.
PROFISSIONAIS DE SAÚDE	EPI: 1. Máscara cirúrgica; 2. Óculos; 3. Capote sobreposto a vestimenta padrão 4. Luvas de procedimento; 5. Gorro. ORIENTAÇÃO: 1. Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%.
PROFISSIONAIS DE APOIO (profissionais da higiene e limpeza, nutrição, manutenção, etc)	EPI: 1. Máscara cirúrgica; 2. Óculos; 3. Capote sobreposto a vestimenta padrão 4. Luvas de procedimento; 5. Gorro. ORIENTAÇÃO: 1. Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%; 2. Profissionais da higiene e limpeza, acrescentar luvas de borracha com cano longo e botas impermeáveis de cano longo.
DEMAIS CASOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS CRITÉRIOS ACIMA COVID-19	



PACIENTE	ORIENTAÇÃO: 1. Etiqueta respiratória; 2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%.
ACOMPANHANTE	ORIENTAÇÃO: 1. Etiqueta respiratória; 2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%.
PROFISSIONAIS DE SAÚDE	EPI: 1. Máscara cirúrgica; 2. Óculos; 3. Capote sobreposto a vestimenta padrão 4. Luvas de procedimento; 5. Gorro. ORIENTAÇÃO: 1. Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%.
PROFISSIONAIS DE APOIO (profissionais da higiene e limpeza, nutrição, manutenção, etc)	EPI: 1. Máscara cirúrgica; 2. Óculos; 3. Capote sobreposto a vestimenta padrão 4. Luvas de procedimento; 5. Gorro. ORIENTAÇÃO: 1. Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%; 2. Profissionais da higiene e limpeza, acrescentar luvas de borracha com cano longo e botas impermeáveis de cano longo.



UNIDADE	SERVIÇO
	TRANSPORTE SAMU E AMBULANCIA SANITÁRIA
CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS	
PACIENTE	EPI: 1. Máscara cirúrgica para sintomático e máscara de tecido para assintomático; ORIENTAÇÃO: 1. Usar lenços de papel (tosse; espirro; secreção nasal); 2. Higienizar as mãos frequente com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%.
ACOMPANHANTE	EPI: 1. Máscara tecido; ORIENTAÇÃO: 1. Usar lenços de papel (tosse; espirro; secreção nasal); 2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%.
PROFISSIONAIS DE SAÚDE (Médico/enfermeiro/técnico de enfermagem)	EPI: 1. Máscara cirúrgica; 2. Óculos; 3. Capote sobreposto a vestimenta padrão 4. Luvas de procedimento; 5. Gorro ORIENTAÇÃO: 1. Higienizar as mãos frequente com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%; 2. Os profissionais de saúde deverão utilizar máscaras N95, FFP2, ou equivalente, ao realizar procedimentos geradores de aerossóis como por exemplo, intubação ou aspiração traqueal, ventilação mecânica invasiva e não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, coletas de amostras nasotraqueais.
PROFISSIONAIS DE APOIO EM ASSISTÊNCIA DIRETA (Motorista)	EPI: 1. Máscara cirúrgica; 2. Óculos; 3. Capote sobreposto a vestimenta padrão 4. Luvas de procedimento; 5. Gorro ORIENTAÇÃO: 1. Higienizar as mãos frequente com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%.



DEMAIS CASOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS CRITÉRIOS ACIMA COVID-19

PACIENTE	<p>ORIENTAÇÃO:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Etiqueta respiratória;2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%.
ACOMPANHANTE	<p>ORIENTAÇÃO:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Etiqueta respiratória;2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%.
PROFISSIONAIS DE SAÚDE (Médico/enfermeiro/técnico de enfermagem)	<p>EPI:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Máscara cirúrgica;2. Luvas de procedimento;3. Gorro, óculos de proteção ou protetor facial e avental (para procedimentos que geram aerossóis). <p>ORIENTAÇÃO:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%;2. Os profissionais de saúde deverão utilizar máscaras N95, FFP2, ou equivalente, ao realizar procedimentos geradores de aerossóis como por exemplo, intubação ou aspiração traqueal, ventilação mecânica invasiva e não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, coletas de amostras nasotraqueais.
PROFISSIONAIS DE APOIO EM ASSISTÊNCIA DIRETA (Motorista)	<p>EPI:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Máscara cirúrgica;2. Luvas de procedimento;3. Gorro, óculos de proteção ou protetor facial e avental (para procedimentos que geram aerossóis). <p>ORIENTAÇÃO:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%;2. Os profissionais de saúde deverão utilizar máscaras N95, FFP2, ou equivalente, ao realizar procedimentos geradores de aerossóis como por exemplo, intubação ou aspiração traqueal, ventilação mecânica invasiva e não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da



	intubação, coletas de amostras nasotraqueais.

4. Considerações finais

Ressaltamos que as orientações se aplicam ao cenário atual, período este de pandemia, e pela alta transmissibilidade do vírus onde os profissionais estão expostos a uma quantidade significativa de pacientes que buscam atendimento nas unidades de saúde. Orientamos aos gestores das unidades aplicar o protocolo por áreas.

A máscara de tecido NÃO é um EPI, por isso não deve ser usada quando se deveria usar a máscara cirúrgica (durante a assistência ou contato direto, a menos de 1 metro de pacientes), ou quando se deveria usar a máscara N95/PFF2 ou equivalente (durante a realização de procedimentos potencialmente geradores de aerossóis)

TODOS os profissionais deverão fazer uso da máscara de proteção nas instituições de saúde, bem como pacientes e acompanhantes.

Frisamos sobre a preocupação da Secretaria Municipal de Saúde com todos os seus profissionais e não está medindo esforços para que não falte insumos, todavia alertamos sobre a responsabilidade e consciência no uso de EPIs, pois assim como em todo o país estamos sujeitos a riscos de possíveis desabastecimentos nos grandes centros de distribuição.

Referências



1-Nota técnica gvims/ggtes/anvisa nº 04/2020.Orientações para serviços de saúde: medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (sars-cov-2)-atualizada em 31/03/2020.

2-Brasil. Ministério da Saúde. Protocolo de Manejo Clínico para o novo Coronavírus (2019-nCoV). Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência. Coordenação-Geral de Urgência. Brasília: Ministério da Saúde, 2020.

3-Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Boletim Epidemiológico Nº 05. Secretaria de Vigilância em Saúde SVS/MS-COE - Mar. 2020.

4- NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 07/2020 ORIENTAÇÕES PARA A PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO DE COVID-19 DENTRO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. (COMPLEMENTAR À NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020). Gerência de Vigilância e Monitoramento em Serviços de Saúde. Gerência Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

5-NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 06/2020 ORIENTAÇÕES PARA A PREVENÇÃO E O CONTROLE DAS INFECÇÕES PELO NOVO CORONAVÍRUS (SARS-CoV-2) EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS - Revisão: 29.05.2020 (COMPLEMENTAR À NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020) Gerência de Vigilância e Monitoramento em Serviços de Saúde. Gerência Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

	Nome	Cargo	Área de Atuação
Elaboração	Hérica Souza Leguizamon	Coordenadora	Governança Clínica
Elaboração	Débora Almeida Franco	Apoio Institucional	SAS
Elaboração	Núria Neres do Vale	Enfermeira	
Revisão	Thais Kato de Sousa	Enfermeira	Governança Clínica
Aprovação	COE Aparecida de Goiânia		
Colaboradores			
Colaboradores			

Aparecida de Goiânia, 15 de julho de 2020.



Alessandro Magalhães
Secretário de Saúde