



SINAIS E SINTOMAS QUE PODEM INDICAR VIOLÊNCIA

CICLO DE VIDA	ALTERAÇÕES
CRIANÇA	<ul style="list-style-type: none">• Choro injustificado;• Irritabilidade frequente;• Indiferença;• Apatia;• Tristeza constante;• Reações negativas exageradas a estímulos comuns;• Atraso no desenvolvimento com perdas e/ou regressões a fases anteriores;• Distúrbios do sono e na alimentação;• Atraso escolar, dificuldades de aprendizagem e/ou faltas frequentes;• Ansiedade e/ou medo relacionados a determinadas pessoas, objetos ou situações;• Dificuldade de socialização e tendência ao isolamento;• Comportamento destrutivo;• Pesadelos constantes;• Baixa autoestima e autoconfiança;• Hiperatividade;• Desidratação, desnutrição, higiene precária, vestuário inapropriado ao clima/ambiente, escaras e assaduras.
	SINAIS DE VIOLÊNCIA SEXUAL
	<ul style="list-style-type: none">• Comportamento sexual incompatível com a idade;• Irritabilidade e/ou agressividade;• Lesões, edemas e/ou outros desconfortos na região genital sem outras causas que as justifiquem;• Lesões no palato ou dentes anteriores;• Sangramento vaginal em pré púbere;• Lesões, sangramento, cicatrizes, dilatação e/ou flacidez do esfíncter anal sem doença que justifique;• Rompimento himenal;• Descontrole da micção (enurese ou encoprese);• Secreções vaginais ou penianas;• DST;• Gestação;• Aborto.



ADOLESCENTE	<ul style="list-style-type: none">• Desejo e/ou tentativa de autoextermínio;• Uso abusivo de drogas;• Exposição a riscos;• Cometimento de infrações.
	<p style="text-align: center;">SINAIS DE VIOLÊNCIA SEXUAL</p> <ul style="list-style-type: none">• Comportamento sexual incompatível com a idade;• Irritabilidade e/ou agressividade;• Lesões, edemas e/ou outros desconfortos na região genital sem outras causas que as justifiquem;• Lesões no palato ou dentes anteriores;• Sangramento vaginal em pré púbere;• Lesões, sangramento, cicatrizes, dilatação e/ou flacidez do esfíncter anal sem doença que justifique;• Rompimento himenal;• Descontrole da micção (enurese ou encoprese);• DST;• Gestação;• Aborto.
ADULTO	<p style="text-align: center;">MULHERES</p> <ul style="list-style-type: none">• Fraturas de ossos e/ou outras lesões no rosto, mãos, pernas, braços e costelas;• Falta de concentração;• Irritabilidade;• Choro frequente;• Crises de pânico e/ou fobias;• Autorreprovação, sentimento de inferioridade, fracasso, insegurança e/ou culpa;• Depressão;• Isolamento;• Evitação em receber visitas;• Mudanças frequentes de moradia e emprego;• Resistência em buscar serviços especializados.
	<p style="text-align: center;">HOMENS</p> <ul style="list-style-type: none">• Uso abusivo de álcool e outras drogas;• Exposição a riscos;• Cometimento de atos ilícitos.



IDOSO

- Demonstração de medo de cuidados ou familiar;
- Insegurança em responder perguntas de profissionais de saúde, consultando antes o cuidador;
- Sentimento de solidão;
- Expressões de baixa autoestima;
- Depressão, agitação e/ou condutas infantis;
- Faltas e/ou atrasos em consultas previamente agendadas;
- Visitas frequentes aos serviços de emergência;
- Contusões, escoriações, queimaduras e/ou lesões em diferentes estágios de evolução e sem justificativa compatível;
- Desidratação, desnutrição, higiene precária, vestuário inadequado ao clima/ambiente, escaras e assaduras.

Fontes: Manual para atendimento às vítimas de violência na rede de saúde pública do DF, Secretaria de Saúde do Distrito Federal, 2009; Fluxograma para atendimento dos casos de violência, Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, 2017, adaptado da Linha de Cuidado para atenção integral à saúde de crianças, adolescentes e suas famílias em situação de violências: orientação para gestores e profissionais de saúde Ministério da Saúde, Brasília, 2010.



PREFEITURA DE
APARECIDA

SECRETARIA DE SAÚDE



PREFEITURA DE
APARECIDA

SECRETARIA DE SAÚDE