

RESULTADOS DE TESTES RÁPIDOS

Número de Registro: _____ N° RG _____

Nome do Paciente: _____ Sexo: _____

Data de nascimento: ____/____/____ Data da coleta: ____/____/____

Amostra: Sangue total

HIV Teste 1: () NÃO REAGENTE () REAGENTE *Referência: Não Reagente*
Laboratório: _____ Lote: _____ Validade: _____ Método: Imunocromatografia

HIV Teste 2: () NÃO REAGENTE () REAGENTE () Não realizado *Referência: Não Reagente*
Laboratório: _____ Lote: _____ Validade: _____ Método: Imunocromatografia

CONCLUSÃO: _____ *Referência: Não Reagente*

*Exame realizado em conformidade com a Portaria SVS/MS nº 29/2013. O teste rápido utilizado para HIV é um teste de diagnóstico. Amostra NÃO REAGENTE: Em caso de suspeita de infecção pelo HIV, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta dessa amostra e submetida ao teste.

SÍFILIS: () NÃO REAGENTE () REAGENTE *Referência: Não Reagente*
Laboratório: _____ Lote: _____ Validade: _____ Método: Imunocromatografia

*Exame realizado em conformidade com a Portaria GM/MS nº 3.242/2011. O teste rápido utilizado é um teste treponêmico, representa um teste de Triagem qualitativa para detecção de anticorpos para o *T. Pallidum*. Amostra NÃO REAGENTE: Em caso de suspeita de Sífilis, uma nova amostra deverá ser coletada 30 dias após a data da coleta dessa amostra e submetida ao teste. Amostra com resultado REAGENTE: o paciente deverá realizar um teste não treponêmico para a finalização do diagnóstico e acompanhamento do caso. A situação clínica e epidemiológica do paciente deverá ser observada.

HEPATITE B: () NÃO REAGENTE () REAGENTE *Referência: Não Reagente*
Laboratório: _____ Lote: _____ Validade: _____ Método: Imunocromatografia

*O teste rápido utilizado é um teste triagem para hepatite B. Amostra com resultado NÃO REAGENTE: verificar o esquema vacinal e avaliar a janela imunológica. Caso não tenha informações sobre vacinação, solicitar o retorno após 60 dias. Amostra com resultado REAGENTE: o paciente deverá ser encaminhado para realização de testes complementares para conclusão do diagnóstico.

HEPATITE C: () NÃO REAGENTE () REAGENTE *Referência: Não Reagente*
Laboratório: _____ Lote: _____ Validade: _____ Método: Imunocromatografia

*O teste rápido utilizado é um teste triagem para hepatite C. Amostra com resultado NÃO REAGENTE: avaliar a janela imunológica e retornar após 90 dias para realizar novo exame. Amostra com resultado REAGENTE: encaminhar o paciente para realização de testes complementares para conclusão do diagnóstico.

RESPONSÁVEL TÉCNICO