



ORIENTAÇÕES PARA VÍTIMAS DE AGRESSÃO

1. O coquetel Anti-HIV deverá ser tomado por 28 dias, uma vez ao dia, após alimentar-se.
2. O uso do coquetel Anti-HIV poderá causar efeitos colaterais como: náuseas, vômitos, dor de cabeça, dor de estômago, diarreia, tontura, insônia, falta de apetite e outros. Em caso de piora dos efeitos colaterais o paciente deverá procurar a UPA mais próxima para avaliação.
3. É recomendado ingerir bastante líquido para amenizar os efeitos colaterais.
4. É PROIBIDO ingerir bebida alcoólica durante o uso do coquetel Anti-HIV.
5. Mulheres que estejam em amamentação deverão suspender o aleitamento.
6. Mulheres em uso de anticoncepcional devem manter o uso.
7. O uso de anticoncepção de emergência poderá interferir no próximo ciclo menstrual, antecipando ou atrasando a menstruação.
8. Todos os pacientes deverão retornar ao Ambulatório Ipê (Atendimento às Vítimas de Violência Sexual de Aparecida de Goiânia), em data orientada.
9. Os retornos no Ambulatório Ipê serão programados ao longo dos próximos 06 meses.
10. É recomendado o uso de preservativo (camisinha) em todas as relações sexuais até o último resultado de HIV NEGATIVO.
11. O não comparecimento aos retornos programados é de total responsabilidade do paciente que, caso não retorne, assume automaticamente todos os riscos em relação à sua saúde física e psíquica, isentando a equipe de toda e qualquer responsabilidade.
12. Adultos: recomenda-se realizar Boletim de Ocorrência na Delegacia da Mulher.
13. Criança/adolescente: OBRIGATÓRIO realizar Boletim de Ocorrência na Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente.

DECLARO QUE LI E COMPREENDI TODAS AS INFORMAÇÕES ACIMA, PRESTADAS POR _____

_____ E ME COMPROMETO A RETORNAR AO AMBULATÓRIO IPÊ

NO DIA ____/____/____ AS ____:____ HORAS.

PACIENTE OU RESPONSÁVEL

PROFISSIONAL DE SAÚDE ____/____/____