

SECRETARIA DE SAÚDE

SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA CENTRO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE



N°09

CLIPPING SEMANAL DE RUMORES EM SAÚDE PÚBLICA

Semana epidemiológica 13, período de 24/03/2024 a 30/03/2024

MARÇO

Amarelo Endometriose

Azul-Marinho- Câncer colorretal Lilás - Câncer do colo de útero

CONTATO:



(62) 3545-9279/ 99290-4047



notifica.cievsapgyn@gmail.com



ELABORAÇÃO EQUIPE CIEVS:

Byanca Karla B. Da Silva

Dayanne Priscylla P. De Deus

Giselle Pereira Martins de Souza

Keilla Symone Paraguassu Oliveira

REVISÃO:

Gislene Marques de Lima Coordenadora de Vigilância Epidemiológica

APROVAÇÃO:

Daniela Fabiana Ribeiro Superintendente de Vigilância em Saúde O Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) realiza diariamente uma busca ativa de rumores nas notícias veiculadas pela mídia, abrangendo diversos canais de comunicação. Esse processo visa aprimorar a capacidade de detecção e resposta a emergências em saúde pública.

O "clipping" representa o registro sistematizado dessa busca, abarcando informações estratificadas que tenham relevância para a saúde pública, independentemente de sua origem local, estadual, nacional ou internacional. É fundamental salientar que o "clipping" mantém a integridade do texto original das fontes de informação, preservando, assim, a autenticidade dos relatórios.

A Avaliação de Risco dos Rumores

Todos os rumores identificados que possam envolver risco à saúde pública devem ser avaliados e classificados conforme estabelecido no anexo II do RSI. A avaliação de risco dos rumores se propõe a fazer um julgamento prévio do evento captado, em relação ao seu potencial para emergência em saúde pública.

Os parâmetros serão avaliados conforme descrição abaixo:

- 1. Impacto sobre a saúde pública.
- 2. Evento incomum ou inesperado.
- 3. Há risco signficativo de propagação.
- 4. Há potencial impacto no comércio ou viagens.

Outra forma de avaliação dos rumores detectados é avaliar a relevância deste, devendo considerar a importância do rumor na saúde humana, na assistência, na relevância social e na capacidade de resposta da equipe da vigilância.



SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA CENTRO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE





N°09

CLIPPING SEMANAL DE RUMORES EM SAÚDE PÚBLICA

Semana epidemiológica 13 período de 24/03/2024 a 30/03/2024

VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE SEGUE EM 38 POSTOS DE APARECIDA DE GOIÂNIA



Idosos, gestantes, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, pessoas com deficiência ou comorbidades, trabalhadores da saúde e da educação, dentre outros grupos prioritários, já podem se vacinar. A Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia (SMS) continua com a Campanha de Vacinação contra a Influenza e reforça o convite aos grupos prioritários para a imunização.

Foto: Jhonney Macena Data da notícia: 25/03/2024

Link: AQUI

RECÉM-NASCIDO É ENCONTRADO ABANDONADO DENTRO DE BALDE EM APARECIDA DE GOIÂNIA



dentro de um balde ainda com o cordão umbilical na madrugada deste sábado (23), em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. Uma mulher que passava pelo local na Avenida Independência, na Cidade Livre, encontrou o bebê. A Polícia Civil disse que o caso está sendo investigado.

Um recém-nascido foi encontrado abandonado

Foto: TV Anhanguera Data da notícia: 23/03/2024

Link: AQUI

SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA CENTRO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE





N°09

CLIPPING SEMANAL DE RUMORES EM SAÚDE PÚBLICA

Semana epidemiológica 13 período de 24/03/2024 a 30/03/2024

SOBE PARA 69 O NÚMERO DE MORTES POR DENGUE EM GOIÁS; SAÚDE REFORÇA ALERTA



Foto: Evanto Data da: 25/03/2024

Link: AQUI

O número de mortes por dengue em Goiás subiu para 69, conforme dados do painel de monitoramento de Arboviroses da Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO). Outros 99 óbitos suspeitos estão em investigação. Além disso, Goiás registrou 139.398 casos notificados e 63.971 confirmados de dengue neste ano. Anápolis lidera como a cidade com o maior número de mortes pela doença, chegando a 13. Em seguida estão os municípios de Luziânia (8), Valparaíso (5), Águas Lindas (4), Aurilândia (4), Uruaçu (4), Cristalina (3), Novo Gama (3), Goiânia (2), Iporá (2), Cidade Ocidental (2) e Santo Antônio do Descoberto (2). Outras cidades como Caldas Novas, Alvorada do Norte, Aparecida de Goiânia, Formosa, Mineiros, Ouvidor e Alto Horizonte têm um óbito cada. Goiânia é a cidade que investiga a maior quantidade de mortes, totalizando 17.

78 MUNICÍPIOS DE GOIÁS ESTÃO EM ALERTA PARA CHUVAS INTENSAS NO FIM DE SEMANA



Foto: Pixabay

Data da notícia: 29/03/2024

Link: AQUI

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (CIMEHGO), emitiu um alerta nesta sexta-feira (29) para 78 municípios com risco de chuvas intensas para este fim de semana. Conforme a previsão, as chuvas devem variar de 20 a 50 milímetros(mm), acompanhadas de raios e rajadas de vento acima de 60 km/h em algumas regiões do Estado.

SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA CENTRO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE





N°09

CLIPPING SEMANAL DE RUMORES EM SAÚDE PÚBLICA

Semana epidemiológica 13 período de 24/02/2024 a 30/03/2024

SURTO DE DENGUE NAS AMÉRICAS PODE SER O MAIOR DA HISTÓRIA, ALERTA OPAS




As autoridades da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) alertaram nesta quinta-feira (28) que o surto de dengue nas Américas pode ser o pior já registrado. Brasil, Argentina e Paraguai são os países mais atingidos pela doença. Os casos de dengue nas Américas aumentaram três vezes nos primeiros três meses deste ano em relação ao número de infecções relatadas no mesmo período do ano passado, disse o chefe da OPAS. "Provavelmente esta será a pior temporada de dengue que teremos", pontuou o doutor Jarbas Barbosa da Silva, em entrevista coletiva.

Foto: Joao Paulo Burini/GettyImages

Data da notícia: 28/03/2024

Link: AQUI

FIOCRUZ: CASOS DE SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE CRESCEM NO PAÍS, APONTA INFOGRIPE



O número de casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) aumentou em todo o Brasil. Dados do boletim Infogripe, divulgados nesta quinta-feira (28) pela Fiocruz, mostram crescimento em todos os estados, mas com distinções em relação aos vírus respiratórios. Os dados são referentes ao período de 17 a 23 de março. Segundo a análise, esta alta é causada pela circulação, em diversos estados, de diferentes vírus respiratórios, como o da influenza (gripe), o vírus sincicial respiratório (VSR) e rinovírus. Os grupos mais afetados são crianças, jovens e adultos.

Foto: Agência O Globo Data da notícia: 28/03/2024

Link: AQUI





SECRETARIA DE SAÚDE

SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA CENTRO DE INFORMACÕES ESTRATÉGICAS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE

N°09

CLIPPING SEMANAL DE RUMORES EM SAÚDE PÚBLICA

Semana epidemiológica 13 período de 24/03/2024 a 30/03/2024

MOÇAMBIQUE: QUASE 900 NOVOS CASOS DE CÓLERA E UMA MORTE



Foto: Sitoi Lutxeque/DW Data da notícia: 24/03/2024

Link: AQUI

As autoridades sanitárias moçambicanas registraram quase 900 novos casos de cólera e um óbito no norte do país em cerca de dez dias, indicam dados oficiais. Nampula é a província mais afetada pelo atual surto. De acordo com o mais recente boletim sobre a progressão da doença, elaborado pela Direção Nacional de Saúde Pública e com dados até 19 de março, estava contabilizado um acumulado de 14.274 casos de cólera desde 1 de outubro em Moçambique. No boletim anterior, com dados até 8 de março, o acumulado era de 13.397 casos de cólera, que provocaram até então 30 mortos. No mês de março há registro oficial de três mortos por cólera no país, segundo os mesmos dados. A taxa de letalidade da doença em Moçambique mantém-se atualmente em 0,2%, mas o total de internados aumentou para 94.

"DOENÇA MISTERIOSA" EM VACAS LEITEIRAS DOS EUA É CEPA AGRESSIVA DE GRIPE AVIÁRIA



Apenas uma semana após ter infectado uma criação de cabras no Minnesota, a cepa agressiva do vírus H5N1 da gripe aviária chegou pela primeira vez também ao rebanho bovino dos Estados Unidos. O Departamento de Agricultura (USDA), a vigilância sanitária (FDA) e o Centro para Controle e Prevenção de Doenças (CDC) confirmaram que vacas leiteiras, a maioria de idade mais elevada, foram diagnosticadas com o vírus em três fazendas do Texas e uma no Arkansas. Outro foco é investigado no Novo México. A transmissão teria ocorrido aparentemente pelo contato com aves migratórias, e há relatos de vários pássaros mortos em algumas granjas leiteiras.

Foto: Antônio More / Arquivo

Gazeta do Povo

Data da notícia: 26/03/2024

Link: AQUI